



ÖSTERREICHISCHES ROTES KREUZ

Aus Liebe zum Menschen.

MEDIKAMENTENÜBERSICHT Stand: Juli 2011

Zeichenerklärung:

Wo. → Woche/n

Mo. → Monate

Abführmittel	am nächsten Tag	→ spendetauglich
Acemin	siehe Blutdrucksenkende Mittel	
Acecomb	siehe Blutdrucksenkende Mittel	
Actonel	siehe Osteoporosemittel	
Aerius	siehe Allergiemittel	
Adalat	siehe Blutdrucksenkende Mittel	
Aeromuc	siehe Hustenmittel	
Agilan	blutdruckerhöhendes Mittel	→ spendetauglich
Agopton	siehe Magensäurehemmer / Magenschutz	
Akineton	bei restless legs Syndrom	→ spendetauglich
	Hinweis auf chronische neurologische Erkrankung	→ keine Spende
Allergiemittel	z.B.: Aerius, Fenistil, Tavegyl, Xyzall, Zyrtec	
	zur Vorbeugung	→ spendetauglich
	während Akutphase	→ keine Spende
Allopurinol	siehe Gichtmittel	
Alna retard	siehe Prostatamittel	
Amaryl	siehe Blutzuckersenkendes Mittel	
Antabus		→ keine Spende
Antibabypille		→ spendetauglich
Antibiotika bei Infekten	z. B.: Augmentin, Ciproxin, Dalacin, Josalid, Klacid, Motrim, Otreon	→ 4 Wo. nach Absetzen
Antibiotika bei Akne	z. B. Minocin, Minostad, Doxiderm	→ spendetauglich
	Vitamin-A-Säure-Präparate z. B.: Roaccutan, Ciscutan Lurantal, Isotretinon, Toctino	→ 12 Mo. nach Absetzen

Antidepressiva	z. B.: Cipralex, Fluctine, Gewalcam, Melleril, Remeron, Seropram, Seroxat, Sinequan, Trittico, Xanor	
	bei leichter Depression, wenn gut eingestellt	→ spendetauglich
	vergleiche auch Lithiumpräparate und Psychopharmaka	
Arimidex		→ keine Spende
Artzal	siehe Knorpelaufbaukur	
Aspirin oder Aspirin C	bei Fieber bis 38,5	→ 2 Wo.
	über 38,5	→ 4 Wo.
	Aspirin bei Schmerz	→ spendetauglich nach Abklingen der Beschwerden
	Aspirin oder Thromb-ASS zur Vorbeugung	→ spendetauglich beim Gesunden
	Aspirin als Dauertherapie bei Herzerkrankungen, Durchblutungsstörungen etc.	→ keine Spende
Asthmamittel	z.B.: Berodual Spray, Berotec, Seretide, Spiriva, Sultanol,	
	als Dauermedikament	→ abhängig von Lungenfunktion und Belastbarkeit
	bei Allergie	→ spendetauglich, wenn nicht akut
Baldrian-Präparate		→ spendetauglich
Baneocinsalbe	siehe Heilsalben	
Beloc	siehe Blutdrucksenkende Mittel	
Berodual Spray	siehe Asthmamittel	
Berotec	siehe Asthmamittel	
Betaisodonasalbe	siehe Heilsalben	
Betaserc	siehe Durchblutungsfördernde Mittel	
Beta-Blocker	siehe Blutdrucksenkende Mittel	
	bei Herzerkrankungen und Rhythmusstörungen	→ keine Spende
Bioflorin	siehe Durchfallmittel	
Bisolvon	siehe Hustenmittel	
Blasenschwäche-Präp.	z. B.: Detrusitol, Inkontan	→ spendetauglich
Blutdrucksenkendes Mittel	wenn gut eingestellt (unter 180 systolisch und 100 diastolisch)	→ spendetauglich
Blutfettsenkende Mittel	wenn Cholesterin/Triglyceride unter 300 mg/dl	→ spendetauglich

Blutzuckersenkendes Mittel	z.B.: Amaryl, Diabetex, Euglucon, Glucophage, Insulin, Metformin	→ keine Spende
Blopress	siehe Blutdrucksenkende Mittel	
Broncho-Vaxom	siehe Immunstimulationsmittel	
Buccalin	siehe Immunstimulationsmittel	
Calcium-Präparate / Vitamine	z. B. Maxi-Kalz	→ spendetauglich
Cal-D-Vita	siehe Osteoporosemittel	
Canesten-Präparate	siehe Pilzinfektionsmittel	
Ceremin	siehe Durchblutungsfördernde Mittel	
Chinin	siehe Malariavorsorgemittel	
Ciprallex	siehe Antidepressiva	
Ciscutan	siehe Vitamin-A-Säurepräparate	
Codipront	siehe Hustenmittel	
Co-Enac	siehe Blutdrucksenkende Mittel	
Condrosulf	siehe Knorpelaufbaukur	
Concor	siehe Beta-Blocker	
Cortison-Präparate	bei Hauterkrankungen (Salben) – abhängig von der Grunderkrankung	→ spendetauglich
	kombiniert mit Schmerzmitteln bei Rücken- und Muskelschmerzen	→ nach Abklingen der Beschwerden
	vorbeugend bei Sonnenallergie	→ spendetauglich
Cosaar	siehe Blutdrucksenkende Mittel	
Daflon	bei Venenbeschwerden, Wadenkrämpfen	→ spendetauglich
Dalacin	siehe Antibiotika	
Deanxit	bei gelegentlicher Einnahme als Beruhigungsmittel	→ spendetauglich
	siehe Antidepressiva oder Psychopharmaka	
Deflamat	siehe Schmerzmittel	
Diclofenac	siehe Schmerzmittel	
Digitalis-Präparate	Einnahme ist Hinweis auf Herzschwäche	→ keine Spende
Dilatrend	bei Herzinsuffizienz	→ keine Spende
Dilzem	siehe Blutdrucksenkende Mittel	
	bei Angina pectoris	→ keine Spende
Dolomo	siehe Schmerzmittel	
Dolonerv	siehe Schmerzmittel	
Doloneurobion	siehe Schmerzmittel	
	bei Herpes Zoster	→ 3 Mo. nach Abklingen

Doederlein Med-Vaginalkapseln	wenn keine bakterielle Infektion	→ spendetauglich
Dominal	wenn gelegentl. als Schlafmittel	→ spendetauglich
Durchblutungsfördernde Mittel	z.B.: Dusodril, Tebofortan, Tebonin, Trental	
	vorbeugend	→ spendetauglich
	bei Tinnitus	→ spendetauglich
	bei Hörsturz	→ 3 Mo. nach Absetzen
	bei arterieller Durchblutungsstörung	→ keine Spende
Durchfallmittel	z. B.: Bioflorin, Eucarbon, Hylak-Präparate, Imodium bei Durchfall (auch nach Antibiotika fragen)	→ 4 Wo. nach Absetzen
Dusodril	siehe Durchblutungsfördernde Mittel	
Effortil	blutdruckerhöhendes Mittel	→ spendetauglich
Eisen-Präparate	bei normalem Blutbild	→ 4 Wo. nach Absetzen
	bei chronischer Anämie	→ keine Spende
Enac	siehe Blutdrucksenkende Mittel	
Euglucon	siehe Blutzuckersenkendes Mittel	
Eucarbon	siehe Durchfallmittel	
Euthyrex	siehe Schilddrüsenhormone	
Fansidar	siehe Malariavorsorgemittel	
Favistan	siehe Schilddrüsenhormone	
Fenistiltropfen oder Tabletten	siehe Allergiemittel	
Fieber- und Schmerzmittel	z. B.: Mexalen, Novalgin, Parkemed	
	bei Fieber unter 38,5	→ spendetauglich nach 2 Wo.
	bei Fieber über 38,5	→ spendetauglich nach 4 Wo.
	siehe Schmerzmittel	
Fluctine	siehe Antidepressiva oder Psychopharmaka	
Fludex	siehe Blutdrucksenkende Mittel	
Fluocalcic	siehe Osteoporosemittel	
Fosamax	siehe Osteoporosemittel	
Fragmin	siehe Thrombosemittel	
Gestagene	Hormonpräparate	→ spendetauglich
Gewacalm	bei gelegentlicher Einnahme als Beruhigungsmittel	→ spendetauglich
	siehe Antidepressiva oder Psychopharmaka	

Gichtmittel	z.B.: Allopurinol, Urosin, Zyloric bei erhöhter Harnsäure, wenn kein akuter Gichtanfall	→ spendetauglich
Glucobene	siehe Blutzuckersenkendes Mittel	
Glucophage	siehe Blutzuckersenkendes Mittel	
Heilsalben	bei Eiterung, Entzündung und Schnittwunden	→ 4 Wo. nach Ausheilung
Halcion	als Einschlafhilfe siehe Psychopharmaka	→ spendetauglich
Harnsäuremittel	siehe Gichtmittel	
Heparin	siehe Thrombosemittel	
Herzrhythmusstörungen	→ keine Spende	
Homöopathische Arzneimittel	→ je nach Diagnose	
Hustenmittel	z.B.: Aeromuc, Bisolvon, Mucosolvan, Tuscalman bei banaler Bronchitis	→ 2 Wo. nach Abklingen
	bei Bronchitis mit Fieber (nach Antibiotikum fragen)	→ 4 Wo. nach Absetzen
Hyalgan	siehe Knorpelaufbaukur	
Hylak-Präparate	siehe Durchfallmittel	
Hypnorex	siehe Lithiumpräparate	
Immunstimulationsmittel	z. B.: Broncho-Vaxom, Buccalin, Luivac, Ribomunyl bei Erkältungs- bzw. Atemwegserkrankungen	→ 4 Wo. nach Absetzen
	siehe Durchfallmittel	
Imodium	siehe Durchfallmittel	
Imurek	Transplantationen	→ keine Spende
Infiltrationen (ins Gelenk)	Schmerzmittel	
	z. B.: Volon-A-Präparate, Voltaren, Xylocain , Xyloneural	→ 4 Wo. nach Absetzen
Infusionen und Injektionen (bei Gelenksschmerzen)	Schmerzmittel	
	z. B.: Ambene, Voltaren solange in Behandlung	→ von Spende abraten
	Quaddeln (mehrere kleine Injektionen unter die Haut)	→ spendetauglich
Isoptin	bei Angina pectoris, Herzrhythmusstörungen	→ keine Spende
	siehe Blutdrucksenkende Mittel (nur noch selten bei Bluthochdruck)	
Isotretinon	siehe Vitamin-A-Säurepräparate	
Jacutin	gegen Krätzmilben	→ 1 Wo. nach Ausheilung
Klacid	siehe Antibiotika bei Infekten	

Knorpelaufbaukur	Hyaluronsäuremittel	
	z. B.: Artzal, Hyalgan	→ spendetauglich, wenn keine Entzündung
Lariam	siehe Malariavorsorgemittel	
Lasix	Entwässerungsmittel	
	bei chronischer Organerkrankung	→ keine Spende
Lansobene	siehe Magensäurehemmer / Magenschutz	
Legalon	bei regelmäßiger Einnahme Hinweis auf Leberschädigung	→ keine Spende
Lexotanil	siehe Psychopharmaka	
Lithiumpräparate	z.B.: Hypnorex, Neurolepsin, Quilonum, Quilonorm	→ keine Spende
Lovenox	siehe Thrombosemittel	
Losec	siehe Magensäurehemmer / Magenschutz	
Luivac	siehe Immunstimulationsmittel	
Lurantal	siehe Vitamin-A-Säurepräparate	
Madopar	bei restless legs Syndrom	→ spendetauglich
	bei chronischer neurologischer Erkrankung	→ keine Spende
Magensäurehemmer / Magenschutz	bei Reflux	→ spendetauglich
	Einnahme als Magenschutz	→ spendetauglich
	bei Ulcus	→ 4 Wo. nach Ausheilung
	nach Magenspiegelung (nach Befund fragen)	→ spendetauglich nach 4 Mo.
	bei chron. Ulcus	→ keine Spende
Malariavorsorgemittel	z. B.: Chinin, Fansidar, Lariam	
	zur Malariaprophylaxe	→ 6 Mo. nach Rückkehr aus Malariagebiet
Marcoumar	Einnahme abhängig von der Grunderkrankung	→ 4 Wo. nach Absetzen
	als Dauertherapie	→ keine Spende
Magnesium-Präparate	z. B.: Magnosolv	→ spendetauglich
Maxi-Kalz		→ spendetauglich
Melleril	siehe Antidepressiva oder Psychopharmaka	
Methotrexat	rheumatoide Arthritis	→ keine Spende
	Schuppenflechte mit Gelenksbeteiligung	
	Krebsbehandlung	
Mexalen	siehe Fieber und Schmerzmittel	
Minocin	siehe Antibiotika bei Akne	
Minostad	siehe Antibiotika bei Akne	

Molsidolat	bei Angina pectoris	→ keine Spende
Monoket	bei Angina pectoris	→ keine Spende
Mucosolvan	siehe Hustenmittel	
Myocardon	Herzerkrankung	→ keine Spende
Nasentropfen	z.B. Otrivin, Nasivin	
	bei Schnupfen	→ spendetauglich nach 2 Wo.
	bei Allergie	→ spendetauglich, wenn nicht mehr akut
Neotigason	bei verhornenden Hauterkrankungen (Schuppenflechte)	→ 12 Monate nach Absetzen
Neurobion	außer bei Herpes Zoster	→ spendetauglich
Neurolepsin	siehe Lithiumpräparate	
Nexium	siehe Magensäurehemmer / Magenschutz	
Nitro-Präparate	Hinweis auf Herzerkrankung	→ keine Spende
Nolvadex		→ keine Spende
Nomexor	siehe Blutdrucksenkendes Mittel	
Norvasc	siehe Blutdrucksenkende Mittel	
	bei Angina pectoris	→ keine Spende
Novalgin	siehe Fieber- und Schmerzmittel	
Oestrogene	Hormonpräparate	→ spendetauglich
Osteoporosemittel	z.B.: Cal-D-Vita, Fluocalcic, Fosamax	→ spendetauglich
Pankreasenzyme	zur Unterstützung der Fettverdauung	→ spendetauglich
	bei Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse	→ keine Spende
Pantoloc	siehe Magensäurehemmer / Magenschutz	
Parkemed	siehe Fieber- und Schmerzmittel	
Penicillin	siehe Antibiotikum bei Infekten	
Pilzinfektionsmittel	im Haut-, Nagel- und Genitalbereich	→ spendetauglich
	Im Magen-, Darm- oder Lungenbereich (nach endoskopischer Untersuchung fragen)	→ keine Spende
Plavix	abhängig von der Grunderkrankung	→ 4 Wo. nach Absetzen
	als Dauertherapie	→ keine Spende
Praxiten	siehe Antidepressiva und Psychopharmaka	
Proscar	siehe Prostatamittel	

Prostagutt	siehe Prostatamittel
Prostatamittel	z. B.: Alna retard, Proscar, Prostagutt bei gutartiger Prostatavergrößerung → spendetauglich
Psyquil	bei Schluckauf → spendetauglich siehe Antidepressiva und Psychopharmaka
Psychopharmaka	wenn gut eingestellt → spendetauglich bei bipolaren Störungen oder Psychosen → keine Spende bei Einnahme von Lithiumpräparaten → keine Spende z. B.: Hypnorex, Neurolepsin, Quilonum, Quilonorm
Quaddeln	siehe Infusionen und Injektionen
Quilonorm	siehe Lithiumpräparate
Quilonum	siehe Lithiumpräparate
Resochin	siehe Malariavorsorgemittel als Therapie bei Rheuma → keine Spende
Rheumasalbe	bei Muskelschmerzen → spendetauglich
Ribomunyl	siehe Immunstimulationsmittel
Roaccutan	siehe Vitamin-A-Säurepräparate
Rhytmonorma	siehe Herzrhythmusstörungen
Rohypnol	geleg. als Schlafmittel (nicht bei Missbrauch) → spendetauglich
Sandoparin	siehe Thrombosemittel
Saroten	siehe Antidepressiva und Psychopharmaka
Schilddrüsenhormone	z. B.: Euthyrex, Favistan, Thyrex, Thyroxin wenn gut eingestellt → spendetauglich bei Hashimoto Thyreoditis → keine Spende bei Verdacht auf Knoten → keine Spende bis abgeklärt
Schmerzmittel	z. B.: Dolomo, Dolonerv, Thomapyrin, Tonopan, Tramal bei akuten Schmerzen, wenn entzündungsfrei → nach Abklingen der Beschwerden bei akuten Entzündungen → 4 Wo. nach Absetzen bei nachgewiesenen Rheumafaktoren → keine Spende
Sedacoron	siehe Herzrhythmusstörungen
Seropram	siehe Antidepressiva und Psychopharmaka
Seroxat	siehe Antidepressiva und Psychopharmaka
Simvastatin	siehe Blutfettsenkende Mittel
Solugastril	siehe Magensäurehemmer / Magenschutz

Sorbidilat	siehe Herzrhythmusstörungen	
Somnubene	bei gelegentl. Einnahme als Schlafmittel	→ spendetauglich
Spiriva	siehe Asthmamittel	
Sortis	siehe Blutfettsenkende Mittel	
Substitol	→ keine Spende	
Sultanol	siehe Asthmamittel	
Tavegyl	siehe Allergiemittel	
Tebofortan	siehe Durchblutungsfördernde Mittel	
Tebonin	siehe Durchblutungsfördernde Mittel	
Tenormin	Je nach Einnahmegrund: siehe Blutdrucksenkende Med./ Herzrhythmusstörung	
Thomapyrin	siehe Schmerzmittel	
Thrombo ASS	siehe Aspirin	
Thrombosantin	siehe Aspirin	
Thrombosemittel	z. B.: Fragmin, Heparin, Lovenox, Sandoparin	
	nach Einnahmegrund fragen	→ 4 Wo. nach Absetzen
Thyrex	siehe Schilddrüsenhormone	
Toctino	siehe Vitamin-A-Säurepräparate	
Tonopan	siehe Schmerzmittel	
Tramal	siehe Schmerzmittel	
Trental	siehe Durchblutungsfördernde Mittel	
Trittico	siehe Antidepressiva	
Tuscalman	siehe Hustenmittel	
Ulcogant	siehe Magensäurehemmer / Magenschutz	
Ulsal	siehe Magensäurehemmer / Magenschutz	
Urosin	siehe Gichtmittel	
Uro-Vaxom	Immunstimulation bei Harnwegsinfektion	→ 4 Wo. nach Absetzen
Valium	bei gelegentlicher Einnahme als Beruhigungsmittel oder Einschlafhilfe	→ spendetauglich
	bei Epilepsie	→ keine Spende
	beim Alkoholentzug	→ keine Spende
Veneruton	Venenbeschwerden	→ spendetauglich
Venostasin	Venenbeschwerden	→ spendetauglich
Venosin	Venenbeschwerden	→ spendetauglich

Vertirosan	bei Schwindel	→ nach Abklingen der Beschwerden
	bei Hörsturz	→ 3 Mo. nach Absetzen
	Morbus Meniere	→ Arzt fragen
Vibrocil	schleimhautabschwellendes Mittel bei Schnupfen	→ 2 Wo. nach Abklingen
Vitamin-A-Säure Pröp.	z. B.: Roacutan, Ciscutan, Lurantal, Isotretinon, Toctino	→ 12 Mo. nach Absetzen
Volon-A-Präparate	bei Hauterkrankungen (Salben)	→ spendetauglich
	vorbeugend bei Sonnenallergie	→ spendetauglich
	kombiniert mit Schmerzmitteln bei Rücken- und Muskelschmerzen	→ solange Behandlung von Spende abraten
Voltaren	siehe Schmerzmittel	
Warzenmittel		→ spendetauglich
Wundsalben	siehe Heilsalben	
Xalatan	Augentropfen bei grünem Star wenn Druck unter 30 mm Hg	→ spendetauglich
Xyloneural	siehe Injektionen, Infiltrationen und Infusionen	
Xyzall	siehe Allergiemittel	
Zantac	siehe Magensäurehemmer / Magenschutz	
Zoviraxsalbe	bei Fieberblase	→ 10 Tage nach Auftreten
Zoviraxtabletten	Herpes Zoster (Gürtelrose), Herpes im Augen- oder Genitalbereich	→ 3 Mo nach Ausheilung
Zyrtec	siehe Allergiemittel	